

# 苏州大学

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称：无机化学、化学生物与分子生物学

考试科目：物理化学 (F) (B) 卷

1. 请给出非线性多原子分子的平动、转动和振动自由度 (10 分)
2. 何为配分函数，其物理意义是什么 (15 分)
3. 10mol 理想气体由 25°C, 1.0Mpa 膨胀到 25°C, 0.1Mpa, 设过程为：(20 分)
  - (1) 自由膨胀；
  - (2) 对外抗恒压 0.1Mpa 膨胀
  - (3) 定温可逆膨胀
 求三种过程中系统对环境所做的功  $W$ ：
4. 在等温等压(298.15,  $P^\theta$ )条件下，某一化学反应在不做非体积功条件下进行，放热 40.0kJ/mol，若该反应通过可逆电池来完成，则吸热 4.00kJ/mol，求该化学反应的熵变  $\Delta_r S_m^\theta$  (15 分)
5. 用统计热力学的方法计算惰性气体 Xe 在标准状态下的熵。Xe 的原子量为 M=131.3 (10 分)
6. 60°C 时甲醇的饱和蒸气压为 83.4kPa，乙醇的饱和蒸气压为 47.0kPa。二者形成理想液态混合物。若混合物的组成为二者的质量分数各 50%，求 60°C 时平衡蒸气压组成，以摩尔分数表示。(20 分)
7. 证明  $(\frac{\partial C_p}{\partial p})_T = -T(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2})_p$  (15 分)
8. 每一摩尔晶体中的原子的摩尔热容为多少，请给出计算过程 (10 分)
9. 已知水的表面张力和温度的关系为 (20 分)
 
$$\gamma = (113.88 - 0.14T) \times 10^{-3} \cdot N \cdot m^{-1}$$
 281.15K 时，可逆拉伸水膜表面使得表面增加  $1.0 \times 10^{-4} m^2$ ，求这个过程的  $W$ ,  $Q$ ,  $\Delta U$ ,  $\Delta H$ ,  $\Delta S$  和  $\Delta A$
10. 298K 下，一半透膜内，有  $0.1dm^3$  的很稀盐酸水溶液，其中溶有  $1.3 \times 10^{-3} kg$  的一元大分子酸，假设它完全离解。膜外是  $0.1dm^3$  的纯水，达到渗透平衡后，膜外  $pH=3.26$ ，由膜内  $H^+$  浓差引起的膜电位是 34.9mV。假设溶液是理想溶液，试计算：(a) 膜内的 pH 值；(b) 该大分子物的摩尔质量 (15 分)

注意：答案请不要做在试题纸上。

试卷标号： 856

第 (1) 页共 1 页

